

新版 MMPI—MMPI-2 简介

莫文彬 宋维真

(中国科学院心理研究所)

当前,在世界范围中,使用最广泛的心理测验是明尼苏达多相个性调查表(MMPI)。据国外统计,世界上关于MMPI的专著和文献早已远远超过8000册(篇);使用这个量表的国家超过65个,翻译成外国文字的语种超过115个。在宋维真的主持下,我国于1980年开始进行MMPI的修订工作,并于1984年,正式确定了MMPI的中国标准。在此之后,我国的心理学家和临床工作者对MMPI进行了广泛深入的使用和研究。此调查表愈来愈引起各方面学者的注意。在中国心理学会于1987年召开的MMPI临床使用问题讨论会及1990年4月召开的全国个性问题讨论会上,与会者一致认为MMPI在我国具有极高的使用价值,并进行了很多深入研究,提出了很多新的见解。

正是由于MMPI有这样广泛而持久的影响,促使美国MMPI标准化委员会在MMPI问世50多年后,第一次对MMPI进行了重大修订。就象James Butcher所说的那样:“几乎所有人都承认,MMPI是一个很好的测量工具,这就是要对它修订的原因。”1989年,明尼苏达大学出版了《MMPI—2施测与计分手册》,标志着MMPI-2的修订工作告一段落。

一、修订MMPI的原因

修订的原因主要有三个方面。

1. 当S.R.Hathaway和J.C.Mckinley最初制定MMPI时,他们的主要目的是将其用于对心理异常的临床评估上。因而,MMPI的条目中包含了有关性的顺应,躯体功能和

宗教等方面的问题。例如,387题:我的小便不困难,也不难控制;490题:我每星期念几次经。然而现在,MMPI用于日益广泛的新的领域,如企业、教育和军事上的人员选拔。对健康人使用这些词句,往往会引起人们的反感,甚至可以说给人以一种不必要的冒犯。

2. 就美国自身而言,由于自测验项目最初编写以来,已历经50多年,美国的文化已经有很大的改变。因此,性别歧视的词句,过时的惯用表达法,越来越陌生的文学素材和有关业余消遣活动的描述等方面的问题,越来越突出了,因而,已受到人们的广泛注意。

3. Hathaway和Mckinley制定的美国常模也有一些问题。首先,他们选取的样本缺乏代表性,没有选取不同地域,不同文化形态以及不同种族的群体。其次,由于在制定常模时,正处于美国经济萧条时期,资金有限,因而选取的样本很小,仅测试了724人。

所有这些原因,促使美国MMPI标准化委员会重新编辑MMPI的项目,并对MMPI进行了重大修订。

二、MMPI-2与原版MMPI的主要不同之处

MMPI-2删除了MMPI中的一些项目,并且对一些项目进行了更改。这些更改分为四种类型:A.删除可能造成性别歧视的词;B.习语和用法的现代化;C.时态、语态等语法方面的澄清;D.简化。表1列出了MMPI中每个量表的项目变动情况。

表1 项目更改和删除对基本量表的影

量表	项目的数目			更改的类型			
	删除	保留	更改	A	B	C	D
L		15	2	1	1		
F	4	60	12	1	5	6	
K		30	1		1		
Hs	1	32	5		1	3	1
D	3	57	2	1	1		
Hy		60	9		4	2	3
Pd		50	4		2	1	1
Mf	4	56	6	1	2	1	2
Pa		40	2	1			1
Pt		48	2	1			1
Sc		78	13		1	7	5
Ma		46	7	4	2	1	
Si	1	69	6		3	2	1
不针对任何基本量表			16	3	7	3	3

摘自: J.N. Butcher和J.R. Graham, Topics in MMPI-2 Interpretation

MMPI-2与原版MMPI的不同之处, 主要有以下几个方面:

1. 原版MMPI 包括566个项目, 其中有16项是重复的。MMPI-2 包括 567 个项目, 其中没有重复项目。
2. 原版MMPI 包含一些令人反感的内容, 如性偏好, 宗教, 肠和膀胱的功能。MMPI-2删除了具有这些内容的项目。大约有14%的项目用更现代化的语言进行了改写。
3. 原版MMPI 包括许多没有什么作用, 不需计分的项目。MMPI-2删除了这些项目, 而用有关自杀, 滥用药物和酒精, A型行为, 人际关系以及治疗依从性的项目取而代之。
4. 原版MMPI 包括4个效度量表: L, F, K。MMPI-2 又增加了三个效度量表: F(B)和两个反应一致性量表, VRIN和TRIN。
5. 原版MMPI 的T分是线性T分。这使得不同量表的T分很难进行比较。MMPI-2使用了一些技术性的处理, 采用了一致性T分。它是基于同一量表分数分布计算出来的。经过这样处理后, 一个特定的T分对于不同的临床量表所代表的百分位数基本相当。
6. 原版MMPI包括 Wiggins 内容量表,

这个内容量表是非常有价值的。但是由于 Wiggins 内容量表项目的选取, 完全凭借主观经验。因而, 在MMPI-2中, 没有Wiggins内容量表, 而新制定了一组共15个内容量表来评估MMPI-2 的主要内容维度(见表 2)。这些量表都是经过统计过程之后建立起来的。

表2 MMPI-2内容量表总览

1. ANX 焦虑	6. BIZ 古怪念头	11. LSE 低自尊
2. FRS 恐惧	7. ANG 愤怒	12. SOD 社会不适
3. OBS 强迫性	8. CYN 愤世嫉俗	13. FAM 家庭问题
4. DEP 抑郁	9. ASP 反社会举动	14. WRK 工作干预
5. HEA 关心健康	10. TPAA 型行为	15. TRT 反向治疗指标

7. 原版 MMPI 的资料收集过程中, 允许忽略一些项目, 因而, 许多被试“不能回答”的分很高, 这就造成了平均分数全面的人为降低。在MMPI-2 的研究中, 鼓励被试对所有项目都作答, 这样, 平均分数受项目忽略的影响减小了。

8. MMPI-2 的常模不仅收集了被试的年龄和性别资料, 而且收集了大量的个人经历和生活事件资料。

此外, 在制定MMPI-2 的美国常模时, 选取的样本更具有代表性。

目前, Butcher和 Graham 等人正致力于在美国推广使用MMPI-2。他们认为, MMPI-2是MMPI的修订和扩充, 它与以前的实证性文献具有连续性。MMPI 的效度和临床量表实际上没有任何损害。对MMPI-2 的效度与临床量表进行因素分析时, 出现四个因素: A (一般性顺应不良); R (过渡控制); Mf (男子气, 女子气); Si (社会内向)。这个结果与对原版MMPI 的13个临床量表和效度量表进行因素分析时的结果基本相同。此外, 美国有研究报告, 与原版 MMPI相比, MMPI-2 更受美国临床心理学家和医生的青睐, 尽管最初熟悉MMPI-2 要花费一定的精力。这些, 都在一定程度上证实了Butcher 和 Graham 等人的观点。对于 MMPI-2在中国应用的价值和前景, 我们也已经着手进行研究。